

EFTER TANDBORTTAGNINGAR OCH OPERATIONER

EFTER ATT HA tagit bort en tand eller genomfört någon annan operation i munnen, finns det några saker som du bör tänka på.

- Undvik att skölja munnen, äta och röka innan bedövningen har gått ut. Vänta minst en timme.
- Borsta inte direkt på sårområdet under den närmaste tiden. I övrigt kan du borsta som vanligt.
- Sug inte på såret och pilla inte i det med tungan! Peta inte i såret även om det känns som om det har fastnat någonting.

EFTERBESVÄR

BLÖDNING: Såret blöder nästan alltid lite efter behandlingen. Det är helt normalt och absolut ingenting att oroa sig över. Om det dröjer innan blödningen upphör kan du använda de kompresser som du har fått av oss. Fukta dem lite ljummet vatten och bit ihop på kompresserna i cirka 30 minuter.

SVULLNAD: Ibland reagerar kroppen genom att sårområdet svullnar upp. Detta kan göra att det blir lite svårare än vanligt att gapa. Svullnad och gapsvårigheter ska efterhand bli bättre och gå tillbaka helt.

VÄRK: Det kan hända att du känner dig öm och att det värker i munnen i ett par dagar. Värken ska minska efterhand. Du kan vid behov lindra den med värktabletter.

KONTAKTA OSS:

- Om du inte får stopp på blödningen eller om det börjar blöda igen efter ett tag.
- Om svullnad och gapsvårigheter inte minskar.
- Om du får svårigheter att svälja eller dricka.
- Om värken inte avtar.
- Om du får feber.



SKANNA
MIG!



Folktandvården Sörmland